


Puhtia preventioon

Yleislääkäripäivät 2023

Suomen Kardiologisen
seuran preventiojaos

Ikävakioitu kuolleisuusluku tärkeimmissä kuolemansyryryhmissä 2020 ja 2021



Lähde: Tilastokeskus, kuolemansyyt


Taulukko 2.2. Kymmenen kulutetuinta lääkeainetta vuonna 2021

Lääkeaine	ATC-koodi	Kulutus (DDD / 1 000 asukasta / vuorokausi)	Muutos vuodesta 2020, prosenttia
Amlodipiini	C08CA01	72,8	+5
Ramipriili	C09AA05	72,6	-2
Atorvastatiini	C10AA05	71,0	+13
Asetyylisalisyylihappo	B01AC06	62,2	0
Kandesartaani	C09CA06	54,4	+11
Losartaani	C09CA01	52,1	+5
Ibuprofeeni	M01AE01	50,9	+2
Rosuvastatiini	A02BC02	48,1	+26
Bisoprololi	C07AB07	42,3	0
Parasetamoli	N02BE01	40,5	-2

Lähde: Fimean lääkemyyntirekisteri

- Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden kulutus kasvoi 4% edellisvuoteen verrattuna.

Ensimmäinen sepelvaltimotautikohtaus




The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Global Effect of Modifiable Risk Factors on Cardiovascular Disease and Mortality

The Global Cardiovascular Risk Consortium

N ENGL J MED 389;14 NEJM.ORG OCTOBER 5, 2023



Viisi tekijää, joihin voi vaikuttaa

- Systolinen verenpaine
- Non-HDL-kolesteroli
- Tupakointi
- Diabetes
- Ylipaino

Selittävät yli puolet kardiiovaskulaarisairastavuudesta

Dyslipidemian moderni diagnostiikka ja hoito

Marit Graner

Milloin preventiivinen hoito olisi hyvä aloittaa?

Robert Bergholm

Sekundaariprevention haasteet

Anna-Mari Hekkala